

3ª DOSE

IMUNODEPRESSÃO



IMUNOSSUPRIMIDOS

- Imunodeficiência primária grave;
- Quimioterapia para câncer;
- Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- Pessoas vivendo com HIV/Aids com $CD4 \leftarrow 200$ céls/mm³;
- Uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, ≥ 14 dias;
- Uso de drogas modificadoras da resposta imune;
- Pacientes em hemodiálise;
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS

- Metotrexato
- Leflunomida
- Micofenolato de mofela
- Azaprina
- Ciclofosfamid
- Ciclosporina
- Tacrolimus
- Mercaptopurina
- Biológicos em geral (infliximabe, etanercept, humira, adalimumabe, tocilizumabe, Canakinumabe, golimumabe, certolizumabe, abatacepte, Secukinumabe, ustekinumabe)
- Inibidores da JAK (Tofacinibe, baracinibe e Upadacinibe)

